



Instructions postopératoires après la chirurgie orale

Saignement

Un peu de saignement peut se attendre à la suite de l'opération. En cas de saignement, placer un tampon de gaze directement sur le site de saignement et appliquer une pression pour 30 minutes. Si le saignement persiste, un sachet de thé humide peut être utilisé pendant 30 minutes. Éviter des liquides chauds, l'exercice, et d'élever la tête. Si le saignement persiste, appelez le bureau immédiatement.

Gonflement

Il est possible que le gonflement et les ecchymoses se produisent autour de la zone de la chirurgie. Ce peut durer quelques jours et ne est généralement pas grave. Vous pouvez utiliser des sacs de glace sur le visage autour de la zone opérée pour les premières 24 heures seulement si nécessaire.

Douleur

Pour la plupart des procédés, le médicament anti-douleur typique sera suffisante. Par exemple, des produits tels que l'ibuprofène / Advil ou de l'acétaminophène / Tylenol. Parfois, le dentiste vous prescrira un médicament plus fort, ou un antibiotique. Ceux-ci devraient être utilisés exactement comme prescrit.

Hygiène

Ne pas rincer ou de cracher pendant 24 heures après la chirurgie. Ce est parce que un caillot de sang se forme et permettre la cicatrisation. Après 24 heures, vous pouvez rincer doucement avec eau salée et se brosser les dents, en faisant attention autour du site chirurgical.

Général

Ne fumez pas après la chirurgie orale. Si les points ont été utilisés, ils se dissolvent habituellement après 3 à 5 jours. Parfois la chirurgie prendra plus de temps que prévu à guérir ou peut-être plus inconfortable que prévu. Pour des questions ou des concerne, ne hésitez pas à communiquer avec le bureau.

2045 Stanley, Suite 1550, Montréal, Québec, H3A 2V4

Office: (514) 844 3112

info@downtownmontrealdentistry.com • downtownmontrealdentistry.com